Contenido destacado del mes – Abril 2019

Endoscopia aplicada a la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)

Dra. Carmen Alonso y Dr. Enrique Pérez Cuadrado

1. Paciente mujer de 32 años, voluntaria de una ONG que vuelve de un viaje a un país tropical hace unos días. Presenta desde hace 2 meses episodios de dolor abdominal en fosa iliaca derecha, náuseas y alteración del ritmo intestinal con predominio de diarrea sin hematoquecia. La sintomatología se acompaña de astenia y pérdida de 7 kilos. La analítica muestra una anemia ferropénica con leucocitosis y PCR de 40 mg/L. Un escáner abdominal confirma un engrosamiento de un asa yeyunal sin otra anomalía. La ileocolonoscopia con biopsias es normal. Los coprocultivos son negativos y la calprotectina fecal tiene un valor de 250 ug/g.

Se decide realizar una cápsula endoscópica que da la siguiente imagen:

Figura 1: Imagen de cápsula endoscópica

Pregunta: ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Tumor de intestino delgado.
- b) Diarrea infecciosa enteroinvasiva
- c) Enfermedad de Crohn
- d) Infección por *Clostridium Difficile*.

¡Respuesta correcta!

c) Enfermedad de Crohn

Comentario:

La presencia de úlceras múltiples de intestino delgado en cápsula endoscópica unido a una calprotectina fecal elevada es altamente sugestivo de enfermedad de Crohn [1]. Los valores de calprotectina fecal por encima de 100-200 ug/g se han demostrado un factor predictivo de positividad de cápsula endoscópica y también de la enfermedad [2].

Respuesta incorrecta

Inténtelo de nuevo

2. Tras 6 años de seguimiento, la paciente refiere dolor abdominal difuso con distensión abdominal y vómitos. En la actualidad se encuentra con tratamiento con infliximab 5mg/kg cada 8 semanas. Se realizan exámenes radiológicos incluyendo un escáner y una resonancia magnética nuclear que muestran una estenosis ileal corta, con asas de intestino delgado proximal dilatadas.

Figura 2: Imagen radiológica.

Pregunta: ¿Cuál sería la opción más aconsejable entre las que se proponen?

- a) Realizar una enteroscopia asistida por balón para dilatar la estenosis o tratarla mediante una prótesis metálica.
- b) Resección quirúrgica amplia de la estenosis de intestino delgado si presenta clínica obstructiva.
- c) Estricturoplastia en primera intención.
- d) Seguimiento clínico sin ajustar el tratamiento, ya que las estenosis cortas de la Enfermedad de Crohn se suelen resolver espontáneamente.

¡Respuesta correcta!

- a) Realizar una enteroscopia asistida por balón para dilatar la estenosis o tratarla mediante una prótesis metálica.

Comentario:

La dilatación endoscópica es una alternativa segura y eficaz a la cirugía en las estenosis cortas de la enfermedad de Crohn [3], obteniendo una mejoría clínica en aproximadamente el 70% de los casos (42-90%) [4]. Los efectos adversos son raros y suelen poder manejarse endoscópicamente o de forma conservadora [5].

Figura 3: Imagen de enteroscopia de doble balón en la que se realiza una dilatación endoscópica de la estenosis de la EC.

Respuesta incorrecta

Inténtelo de nuevo

Si quieres saber más...

- [1] Egea-Valenzuela J, González Suárez B, Sierra Bernal C et al. Development and validation of a scoring index to predict the presence of lesions in capsule endoscopy in patients with suspected Crohn's disease of the small bowel: a Spanish multicenter study. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2018; 30(5):499-505.
- [2] Yousuf H, Aleem U, Egan R et al. Elevated Faecal Calprotectin Levels are a Reliable Non-Invasive Screening Tool for Small Bowel Crohn's Disease in Patients Undergoing Capsule Endoscopy. Dig Dis. 2018;36 (3):202-208
- [3] Gustavsson A, Magnuson A, Blomberg B et al. Endoscopic dilation is an efficacious and safe treatment of intestinal strictures in Crohn's disease. Aliment Pharmacol Ther. 2012;362:151–8.
- [4] Hirai F, Andoh A, Ueno F et al. Efficacy of Endoscopic Balloon Dilation for Small Bowel Strictures in Patients With Crohn's Disease: A Nationwide, Multi-centre, Open-label, Prospective Cohort Study. J Crohns Colitis. 2018; 28;12(4):394-401.
- [5] Hirai F. Current status of endoscopic balloon dilation for Crohn's disease. Intest Res. 2017; 15(2):166-173.

Ha finalizado el caso clínico

Endoscopia aplicada a la Enfermedad Inflamatoria Intestinal
(EII)

Dra. Carmen Alonso y Dr. Enrique Pérez Cuadrado