MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

IACS Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud

guiasalud.es

SEPD SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA DIGESTIVA

Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas

Sociedad Española de Patología Digestiva

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
13 de diciembre de 2013

1. No programar revisiones, ni colonoscopias antes de 5 años, en el seguimento postpolipectomía de pacientes con 1-2 adenomas menores de 1 cm, sin displasia de alto grado, completamente extirpados en una colonoscopia de alta calidad.

- European Guidelines for Quality Assurance in Colorectal Cancer Screening and Diagnosis. First Edition. Segnan N, Patnick J, von Karsa L. (eds). Luxembourg Publications Office of the European Union. 2010 – LX, 386 pp. http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=ND3210390
- Guidelines for colonoscopy surveillance after screening and polypectomy: a consensus update by the US Multi-Society task force on colorectal cancer. Lieberman DA, et al. Gastroenterology 2012; 143: 844-57

2. No dar profilaxis antibiótica a personas con pancreatitis aguda leve.

http://www.nice.org.uk/usingguidance/donotdorecommendations/detail.jsp?action=details&dndid=53

- American College of Gastroenterology Guideline: Management of acute pancreatitis. Tenner S, et al. Am J Gastroenterol 2013; 108: 1400-15.

3. No prescribir IBP como gastroprotección en pacientes sin factores de riesgo de complicaciones gastrointestinales.

- Guidelines for prevention of NSAID-related ulcer complications. Lanza FL, et al. Am J Gastroenterol. 2009 ;104:728-38.

4. No restringir la ingesta de líquidos en los pacientes con ascitis, salvo en presencia de hiponatremia dilucional con natremia inferior a 125 meq/l.

-EASL clinical practice guidelines on the management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis, and hepatorenal syndrome in cirrhosis. European Association for the Study of the Liver. J Hepatol 2010; 53: 397-417.

5. No utilizar la detección de anticuerpos IgA, ni IgG anti-gliadina para el diagnóstico de la enfermedad celiaca.

http://www.nice.org.uk/usingguidance/donotdorecommendations/detail.jsp?action=details&dndid=383

- ACG clinical guidelines: Diagnosis and management of celiac disease. Rubio-Tapia A, et al. Am J Gastroenterol 2013; 108: 656-76.